

Комбинированный препарат (таблетки)
Офлоксацин 200 мг + Орнидазол 500 мг

Хайнеофлокс-О

Вместе работать лучше...

Офлоксацин :

- Высокая бактерицидная активность
- Очень низкая МИК для многих патогенов
- Абсорбция быстрая и полная (95 %)
- Биодоступность - более 96 %
- Обеспечивает высокую экономичность курса лечения

Орнидазол :

- Обладает антипротозойной и антибактериальной активностью;
- Хорошо переносится;
- Активен против анаэробов;
- Активность сохраняется более длительное время, чем у метронидазола;
- Эффективность орнидазола при лечении протозойных или смешанных инфекций выше, чем у метронидазола и тинидазола (94-100%).
- Не дает металлического привкуса во рту, в отличие от тинидазола и метронидазола

Эффективное средство против стойких инфекций



Комбинированный препарат удобнее в применении и предпочтительней с экономической точки зрения

Более миллиона человек уже воспользовались этими преимуществами препарата

Ofloxacin and Ornidazole Tablets

Hineoflox-O™

Because something work best together...



Упаковка снабжена надписью на языке Брайля (для слепых людей).

А также предлагаем:
Хайнеофлокс-200/400
Офлоксацин 200/400 мг

HiGlance®
Think Life !

Основное назначение комбинированного препарата:

Инфекции желудочно-кишечного тракта (амебиаз, включая амебные абсцессы печени; лямблиоз; другие кишечные инфекции, в том числе: брюшной тиф, сальмонеллез, шигеллез), вызванные употреблением некачественной воды и сырых (не мытых) овощей и фруктов.

Применяется при инфекциях других органов и тканей, вызванных чувствительными к компонентам препарата бактериями и простейшими.



Хайнеофлокс-О

Диарея путешественников

Hineoflox-O™

Ofloxacin and ornidazole Tablets

Because something work best together...

Комбинированный антибактериальный препарат с
противопротозойным действием, содержащий офлоксацин и орнидазол.

Показания к применению:

Препарат **Хайнеофлокс-О** предназначен для лечения взрослых больных со смешанными (бактериального и протозойного происхождения) инфекциями, вызванными чувствительными штаммами микроорганизмов:

- инфекциями брюшной полости и желчевыводящих путей (амебиаз, включая амебные абсцессы печени; лямблиоз; другие кишечные инфекции, в том числе брюшной тиф, сальмонеллез, шигеллез);
- гинекологическими инфекциями, ИППП (в том числе вызванными пенициллинустойчивыми гонококками, хламидиями, трихомонадами);
- инфекционно-воспалительные заболевания ЛОР-органов: синусит, фарингит, средний отит, ларингит;
- инфекции кожи и мягких тканей;
- нагноением послеоперационных ран;
- стоматологическими инфекциями (например, острый некротический язвенный гингивит);
- для профилактики в определенных клинических ситуациях перед операциями в гинекологии и абдоминальной хирургии.
- инфекции нижних дыхательных путей: пневмония, абсцесс легкого и обострения хронического бронхита;
- инфекциями мочеполовой системы (острый и хронический пиелонефрит, простатит, цистит, эпидидимит, послеоперационные нагноения);



Способ применения и дозы Хайнеофлокс-О

Взрослым пациентам

Дозы подбираются индивидуально в зависимости от локализации и тяжести течения инфекции, а также чувствительности микроорганизмов, общего состояния больного и функции печени и почек.

Рекомендуемая доза: 1 таблетка каждые 12 часов (2 раза в сутки).

Таблетку следует после приема пищи принимать целиком, не разжевывая и не разрушая, запивая достаточным количеством воды.

- инфекции брюшной полости и желчевыводящих путей (амебиаз [все кишечные инфекции, вызванные *Entamoeba histolytica*], включая амебные абсцессы печени; лямблиоз; другие кишечные инфекции, в том числе брюшной тиф, сальмонеллез, шигеллез) - при диарее: 1 таблетка каждые 12 часов (2 раза в сутки) 5 дней.
- инфекции мочеполовой системы (острый и хронический пиелонефрит, простатит, цистит, эпидидимит, послеоперационные нагноения) - 1 таблетка каждые 12 часов (2 раза в сутки) 7 дней.
- гинекологические инфекции ИППП (в том числе вызванными пенициллинустойчивыми гонококками, хламидиями, трихомонадами) - 1 таблетка каждые 12 часов (2 раза в сутки) 7-10 дней.
- нагноение послеоперационных ран - 1 таблетка каждые 12 часов (2 раза в сутки) 7 - 10 дней.
- стоматологические инфекции (например, острый некротический язвенный гингивит) - 1 таблетка каждые 12 часов (2 раза в сутки) 5 - 7 дней.
- для профилактики в определенных клинических ситуациях перед операциями в гинекологии и абдоминальной хирургии - 1 таблетка каждые 12 часов (2 раза в сутки) 3 - 5 дней.

Стандартная упаковка

В картонной коробке 1 блистер по 10 таблеток с инструкцией по применению

HiGlance Laboratories



Представительство в РФ, странах СНГ и Балтии.

123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 13 а, стр. 3

Тел/Факс: (495) 940-33-96/ 97/ 98, 940-33-12/ 13/ 14

E-mail: rus@higlance.ru


Наш сайт: www.higlance.ru

Фармацевтическая Компания

Хайгланс Лабораториз

Желает Вам здоровья

Региональный торговый представитель



DMC/RUSSIA/003

Manufacturer :-

HiGlance Laboratories Pvt. Ltd., E-11, 12 & 13, Site-B, UPSIDC, Surajpur, Greater Noida-201306, (U.P.), INDIA, Ph. No. : +91 120 2569742, 323324 Tel/Fax:- +91 120 2569743,

Website: www.higlance.com E-mail: info@higlance.com/ info@higlancelabs.com